

AGRONOM

أجرونوم نافتونيك (٣١ جرام/لتر) NAFTONIC

NAFTONIC

أجرونوم نافتونيك

مركب فيسيولوجي محفز للإزهار و زيادة العقد و زيادة حجم الثمار

مركب فيسيولوجي محفز للإزهار و زيادة العقد و زيادة حجم الثمار .

الكثافة : ١,٠٥ جرام/سم^٣
Density : 1.05 gm/cm³
Ph : 8 + 0.5

Importer :



TIBA for trading and agencies and agriculture development

Producer :



UFUK TARIM San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muratpaşa Mh. Utuyol Cd. Büyükdere Sk.
Dericiler San. Sit. E Blok No.9 Bayrampaşa
İstanbul - Turkey
www.ufuktarim.com

- مركب فيسيولوجي محفز للإزهار و زيادة العمق و زيادة حجم الثمار .
- يستعمل أثناء و فترة الإزهار و كذلك في مقاومة البرودة العالية و الصقيع حيث يقلل من تأثير العوامل الجوية
- يستخدم لتقليل التساقط الطبيعي لثمار التفاح .
- يستخدم لتقليل ظاهرة تكتل الشماريخ الزهرية .
- تنشيط النمو الخضري في الخيار / الطماطم / البطيخ / الكانتلوب / الفلفل / الباذنجان / الفاصوليا / البسلة
- يزيد مقاومة الفراولة للصقيع و يزيد من العقد .
- تساعد مادة النتفالتين أسيتك أسيد علي التقليل من التأثير الضار للصقيع أثناء التزهير إذا استعمل قبل سريان العصارة في أنسجة النبات و ذلك عند الفجر في حالة الصقيع الليلي حيث تتم المعالجة الأولى بأسرع فاعلية قبل التدفئة الفسيولوجية و الثانية بعد مرور ٦-٨ أيام من المعاملة الأولى .
- يستخدم كمنظم نمو نباتي لتثبيت الأزهار و زيادة نسبة عقد الثمار .
- يخلط مع معظم الأسمدة و المبيدات ماعدا منظمات النمو الأخرى .

م	المحصول	معدل الاستخدام	توقيت الاستخدام
١	محاصيل الخضار لزيادة العقد (الطماطم - البطيخ - الكانتلوب - الخيار - الفلفل - الفاصوليا - البسلة - الباذنجان	٥٠ سم / ١٠٠ لتر ماء	من ٢-٣ معاملات - الأولى بداية التزهير ويكرر الرش كل ١٠ أيام عندما تكون النباتات في طور من ٢-٤ ورقات و في حالة الشتلات يتم رشها بعد الشتل ١٠-٨ أيام
٢	المحاصيل الخضرية القول البلدي (لزيادة العقد و مقاومة الصقيع) فول الصويا اللوبيبا لزيادة العقد	٥٠ سم / ١٠٠ لتر ماء	الأولى مع بداية التزهير - الثانية بعدها ١٠ أيام
٣	الموالج - لزيادة العقد و تقليل تساقط ما بعد العقد المانجو - لتقليل ظاهرة تكتل الشماريخ الزهرية و تقليل تساقط ما بعد العقد	٥٠ سم / ١٠٠ لتر ماء	الأولى مع بداية التزهير الثانية قبل سقوط بتلات الأزهار
٤	محاصيل الفاكهة (تفاح -كمثري) لزيادة العقد	٥٠ سم / ١٠٠ لتر ماء	الأولى قبل الإزهار بأسبوعين معاملة و أخرى فترة لا تقل عن ١٠-١٢ يوم

1 g/Lit Sodium-5-nitroguaiacolate
2 g/Lit Sodium-ortho-nitrophenolate
3 g/Lit Sodium-para-nitrophenolate
25 g/Lit Sodium-1-naphthalenacetate

انتبه

يجب مطالعة رقعة العنوان اولا .



مسجل بوزارة الزراعة تحت رقم : ٦٢٠٣

يجب مطالعة رقعة العنوان اولا .

لايجوز استعمالها في المنزل , اخفيها بعيدا عن الاطفال وعن المواد الغذائية .
ولايجوز تنفس ابخرة وجزئيات السباد, يمنع تناول الطعام والتدخين أثناء رش او تنفيذ عملية التسميد. لاينصح تلامس المنتج مع العين وبشرة الجلد .
اعراض التسمم : تعمل على ظهور اعراض التعرف والصداع في الرأس .
الاسعاف الأولي : عند الشرب المنتج عشوائيا يجب اعطاء المريض المصاب كمية وافرة من الماء ومحاولة الزامه على التقيئ وغسل معدة المريض عند اقتضاء الضرورة .
المادة المضادة : لايتحوي على مواد مضادة .

نوع المركب : أجرونوم نافتونيك (٣١ جرام/لتر) NAFTONIC

اسم الوكيل : طيبة للتجارة و التسوكيلات و التنمية الزراعية.

العنوان : الشرفية - الصالحية الجديدة

المكتب الفني : المنصورة - عمارة بنك فيصل أمام مبني المحافظة .

ت و الفاكس : ٢٣٠٩٦٥٠ (٥٠)

رقم التسجيل : ٦٢٠٣

تاريخ التسجيل : ٢٠١٦/٠٧/٠٣

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الصلاحية :

Lot No :

رقم التسجيل : ٦٢٠٣

تاريخ التسجيل : ٢٠١٦/٠٧/٠٣

تاريخ الإنتاج :

تاريخ الصلاحية :

لوت ن .

بلد المنشأ : تركيا



Net Volume